

嬰

童

百

問

嬰童百問卷之九

虛羸

第八十一問

仲陽云。虛羸者。脾胃不旺。不能乳食。致使肌膚瘦弱。亦因大病或吐瀉後。脾胃尚弱。不能傳化穀氣也。有冷者。時時下利。唇口青白。有熱溫壯。身熱肌肉微黃。此冷熱虛羸也。冷者木香丸主之。夏月不可服。如有此症。則少服之。熱者胡黃連主之。冬月不可服。如有此症。則少服之。傷寒後虛羸者。竹葉湯主之。常服四君子湯。異攻散。參苓白朮散。主之。劑皆可服也。橘連

九久服充肥兼服肥兒丸

木香丸

治疳痢冷熱不調五色雜下裏急後重。

黃連

淨二錢

木香

紫厚朴

薑製

縮砂仁

夜明沙

隔紙炒各二錢

訶子肉

煨二錢

右爲末粳米飯九麻子大每十五丸乾艾葉生

薑煎湯食前溫服下。

胡黃連丸

治疳勞疳渴乾疳

黃連

半兩淨洗脂膜汁發一夜曬乾

括萋根

烏梅肉

杏仁

浸去皮尖

石蓮子

各二錢

右爲末牛膽汁浸糕糊丸麻子大每十五丸煎

烏梅薑蜜湯下。又療蟲後附消渴方論式藥可

治疳渴及五乾疳

竹葉湯

治傷寒表裏俱虛及諸煩不安

石膏

二兩

半夏

四錢

人參

甘艸

各二錢

麥門冬

六錢去心

右剉散每服二錢水一盞青竹葉生薑各四片

粳米七十

粒同煎嘔加竹葉生薑。

四君子湯

治榮衛俱虛臟腑怯弱不食泄利

人參

去蘆

茯苓

去皮

甘艸

白朮

各等分

右爲末每服二錢水一盞煎七分通口服不拘

時鹽少許白湯點服溫和脾胃進益飲食辟寒

邪障霧氣

異攻散

治吐瀉不思飲食濕中和氣及脾胃虛冷

人參

茯苓

白朮

甘艸

橘紅

木香

等分

右爲末每服二錢薑棗煎服一方去木香

參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不進多困少力煩滿痞噎心
忪氣喘嘔吐泄瀉及傷寒咳嗽此藥中和不熱
久服養氣育神醒脾悅色順正辟邪

白扁豆

斤半薑汁浸
去皮微炒

人參

去蘆

白茯苓

白朮

甘艸

炙

山藥

各二斤

蓮肉

桔梗

薏苡仁

縮砂仁

各一斤

右爲末每服二錢棗湯調下小兒量大小加減

補連丸

治瘦久服消食和氣長肌肉

廣陳皮

黃連

各一兩
去鬚

右爲末別研入麝半錢用猪膽七箇分藥入膽
內將水煮候臨熟以鍼微割破以熟爲度取出
以粟米粥和丸如菜豆大每服二三十丸米飲
下量大小與之無時

肥兒丸

治疳多因缺乳食肉太早以致肌肉消瘦

黃連

局方加
刺豆蔻

陳皮

去白局方去
此用木香

神麴

炒局方有
史君干

麥蘖

炒各一兩加
三棱蓬蘽

白蕪荑

牛兩局方用檳榔

川練子

一兩去核炒

右爲末神麴糊丸麻子大每服二十丸空心米

飲吞下。

快活丸

治脾胃虛弱雖進乳食則遲化而中滿嘔吐肚急面黃肚疼臟腑不調寬中快膈亦治大人十噎五膈並宜服之。

檀香

益智

蓬朮

各五錢

三稜

一兩

砂仁

薑黃

甘松

白豆蔻

甘艸

各一兩半

陳皮

七錢

香附子

三兩

右爲末滴水丸麻子大每服三五十九薑湯白

湯任下。

胃氣不和虛冷

第八十二問

仲陽云胃氣不和面光白無精光口中氣冷不思食吐水肌瘦虛弱腹痛當補脾益黃散主之凡人以胃氣為本惟治病亦然胃氣有實有虛實者則有痞滿內熱之証虛則有嘔吐不食之証虛者益之實者損之欲得其平則可矣平胃散觀音散銀白散壯胃之劑不可缺也

益黃散

治小兒吐瀉脾虛不食米穀不化困倦力少滑腸夜起并疳虛熱并涎唾流涎下

陳皮

去白一兩

丁香

二錢一方用木香

訶子

去自

青皮

去白

甘艸

炙各半兩

右爲末。三歲一錢半。水半盞。煎三分。食前服。

平胃散

治脾胃不和。不思飲食。心腹脇肋脹滿刺痛。口苦無味。胸滿短氣。嘔噦惡心。噯氣吐酸。面色痿黃。體弱肌瘦。怠惰嗜臥。體重節痛。常多自利。霍亂痞噎。隔氣翻胃。並宜服之。

厚朴

去粗皮。水浸一宿。剉薑汁製炒五十兩

甘艸

炙十兩

陳皮

去白

蒼朮

去粗皮。米泔浸一斗。焙乾五斤炒

右爲末。每二錢水一盞薑二片棗二箇煎七分
去薑棗熱服食前入鹽一捻沸湯點服亦得常
服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒暑溫四時
非節之氣。

觀音散

治小兒胃氣不和嘔逆吐利

石蓮肉

去心

人參

神麴

炒各三錢

白茯苓

二錢

甘艸

炙

木香

綿黃耆

炙

白扁豆

炒去灰

白朮

各一錢

右剉散每服二錢水一盞棗一枚藿香三葉煎

空心溫服。

銀白散

治止吐瀉壯胃氣治糞青。

糯米

炒二兩

扁豆

炒二兩

藿香

一分

白朮

炒一分

丁香

二錢

甘艸

炙三錢

右爲末。紫蘇米飲調下。加天麻砂仁白茯苓快脾正色。加炮白附全蝎木香石蓮薑煎服。

食積冷熱

第八十三問

巢氏云。夫宿食不消者。脾胃冷故也。小兒乳哺飲食。取冷過度。冷氣積于脾胃。胃爲水穀之海。脾氣磨而消之。胃氣調和。則乳哺消化。脾傷於冷。則宿食不消。脉沉者傷食不化故也。亦有傷乳傷食而身熱者。惟肚腹之熱尤甚。人之傷積。肚熱糞極臭酸。而夜間有熱。傷積之明驗。人所未曉也。冷者消食丸。木香丸。夜間有熱。天明復涼。乃是傷寒夾食失解故也。當服白餅子。先與微利。次與參蘇飲。發熱地骨皮飲。秦艽散。

退熱而安有實熱者太柴胡湯去大黃亦可服傷寒
論人病有宿食何以別之師曰寸口脉浮而大按之
反澁故知有宿食當下之宜大承氣湯其喘而發熱
者紫霜丸主之冷症用進食丸尤佳亦治食厥乃四
肢逆冷面色青黑是也或當吐而甦有痰者溫膽湯
加減服痰定而嘔自痊冷症丁香丸可服白餅子下
痰亦可

消食丸常服寬中快氣消乳食正顏色

縮砂

陳皮

三稜

蓬朮

神麴炒

麥蘖炒

香附子米泔浸一宿炒

枳殼

檳榔

烏梅各五錢丁香二錢五分

右爲末麴糊丸如菜豆大食後紫蘇湯送下二

三十九

木香丸常服治吐乳瀉乳食積停滯不化

木香

蓬朮

砂仁

青皮去白

朱砂

研細代赭研各二錢大丁一錢齊一錢川巴豆肉去

右爲末和勻飛白麴糊丸麻子大風乾每服二

三九乳傷乳汁下食傷米飲下

丁香丸

丁香

砂仁

二十粒

史君子肉

五箇

烏梅肉

巴豆肉

各三箇
去油

右爲末燭飯丸麻子大每服二三丸陳皮湯下。

虛實腫脹

第八十四問

議曰腫脹二症此由虛中有積久患失治日漸傳變症候多端隨輕重察盛衰審表裏以主治先固其本後正其標斯無急矣有濕腫有毒氣腫傷寒虛腫瀉痢虛腫氣血虛腫有肝脹氣脹癥積脹鎖肚脹腕膈脹食膨脹蛔氣脹虛冷積脹以上腫脹虛積竝當下之各有其法其受濕於脾胃久不剋化氣浮四肢頭面皆腫食毒氣由脾胃傷之冷積毒氣停留于腕膈致虛入腹作腫傷寒下之太蚤乘虛入腹作腫瀉利

之人脾氣亦虛。是以致腫。以上宜平調胃氣。補臟充實。方可去腫。其氣血虛腫。皆由榮衛不順。臟腑怯弱。壅滯三焦。流注百脉。表裏俱虛。邪正相亂。以致四肢浮腫。腹肚膨滿。以上先調榮衛之順。次服分氣以散之。其疳氣積脹。宜先與保童。當兼塌氣以去之。其痞癖氣脹。癥脹。宜三稜以消痞。其鎖肚脹。宜與珍珠天麻丸以通之。其上膈中脘食傷膨脹。宜三稜塌氣大茱連丸以消磨之。其蛔脹。宜下蟲丸以化之。其虛冷積脹。宜沉香煎以溫之。以上諸症。宜調和胃氣。消磨

通利腫脹。必然平復矣。如有熱者。必以葶藶子。牛黃。等
輩以治之。推氣丸劑亦可服。

分氣飲

治小兒腫脹。喘急而氣短。

桔梗

赤茯苓

陳皮

桑白皮

剉

大腹皮

枳殼

炒

半夏麴

真蘇子

微炒

紫蘇

甘艸

炙各二錢

草菓仁

一錢

右剉散。每服一錢半。薑棗煎服。

五疳保童丸

治五種疳疾

五倍子

生

青黛

夜明沙

裹洗

苦練根皮

蘆薈

熊膽

研

黃連

去毛

龍膽艸

生用

乾蟾

酥炙去骨皮

麝香

研

蕪荑

取仁

蟬退

去土各等分

右爲末。粟米糊丸。麻子大。一歲兒二十九。飯飲

下二三服。

楊氏塌氣散

治小兒腹脹氣喘體腫面浮。

陳皮

一合炒

青皮

去穢巴豆二十一粒炒黃色去巴豆用

甘艸

炙各半兩

黑牽牛

二錢半炒炒

肉豆蔻

二錢半炒

右末半錢米飲調下加檳榔一箇

塌氣丸

治小兒疳氣腹脹喘急并面浮腫

丁香

胡椒

炒各五錢

萊菔子

炒

白牽牛

各七錢半

右爲末麪糊丸小豆大三歲三十九米湯下

塌氣散

治小兒腹脹氣粗并疳疾相攻面目浮腫

木香

一錢

青皮

五錢

巴豆

三十粒同炒豆黃色去巴豆用

右爲末。三歲半錢。米湯下。食前連進卽效。

三稜煎丸

治嬰孩食傷生冷。甜膩毒熱等物。脾胃積滯。久不剋化。令兒壯熱。腳冷。痞癖。寒熱。及療癥瘕。中皖不和。膨脹。上膈。氣壅。心腹不得通宣。所以作疾。此藥溫涼。但是諸積滯。食不化。竝宜與服。

京三稜

成塊而煮半兩

蓬朮

竝炮半兩

芫花

二錢半醋浸炒

鼈甲

去裙米醋炙焦半兩

淡豆豉

二錢

巴豆

二十一粒去殼

川當歸

半兩

杏仁

去皮尖二錢半炒令赤

右前四味一處以米醋一碗煮令乾仍用炒起更細剉焙爲末次入當歸末杏仁巴豆淡豉和勻水煮麪糊丸麻子大每服二十九薑湯下大小量加減服之

三稜丸

治小兒停積腹脇脹滿乾噦惡心全不入食

三稜

煨

木香

神麪

炒

陳皮

去白

半夏

薑製各一兩

丁香

桂

各五錢

右爲末麪和丸如黃米大每二十九乳食後溫

生薑湯下。

眞珠天麻丸

治急驚風。請量用之以通爲度。此方仍治吊腸鎖肚。撮口至妙。丸如麻子大。初生患者三日三丸。五日五丸。七日七丸。加青黛名青黛丸。

天南星

炮

天麻

白附子

炮各二錢半

膩粉

半錢

巴霜

一字

蕪荑

炒

全蝎

滑石

各二錢半

右爲末。煮細麪糊丸如麻子大。一歲每服五丸。

二歲十丸大小加減薄荷湯點茶清送下

大茱連丸

治小兒飲食過度胸膈膨脹上下氣不宣通鬱滯迷悶情思少樂大則作喘飲食不化作渴煩躁坐臥不任肢體倦怠腹脇疼痛

蓬朮

京三稜

各二錢半醋煮

乾薑

炮

陳皮

去白

木香

丁香

各三錢

巴豆

二十一粒去膜心出油用

綠細小茱萸

二錢

右爲末醋和爲丸麻子大每服七丸至十丸大

者加服生薑棗子湯下。

下蟲九

治疳蛔諸蟲

苦練根皮

酒浸焙

綠色貫衆

木香

蕪荑

焙

桃仁

浸去皮焙

雞心檳榔

二錢

鶴虱

炒

輕粉

各錢半

乾蝦蟇

炙三錢

史君子

五十個煨取肉用

右爲末飛麪糊丸麻子大每服二十九天明清

肉汁下內加當歸川黃連各二錢半治積疳兼

疳勞之症

沉香煎 治脾氣冷積

乳香

沉香

丁香

杏仁 炒

百草霜

木香

各錢

肉豆蔻

一個

巴豆

十四粒出油如霜

右為末酒煮蠟和丸菜豆大每服三五丸淡生薑湯送下應患肚痛不止者服之效常服以通

為度

推氣丸

治三焦痞塞氣不升降大便秘澀

大黃

陳皮

檳榔

枳實

炒去蘊

黃芩

黑牽牛

各等分
生用

右爲細末煉蜜九棗豆大每服二三十丸臨臥

溫熱水下量虛實加減

遇僊丹

治諸蟲取諸積

牽牛

三斤

大腹子

二斤

錫灰

二兩

炙

大黃

四兩

雷丸

四兩

青木香

二兩

鶴虱

各二兩

乾漆

二兩

皂角

四條

右後四味煎水脂藥米煮粥初用牽牛末六兩

大腹末三兩錫灰四兩用大黃五兩雷丸六兩

木香和劑丸如梧桐子大每服五七丸用薑湯
熟水送下

此藥專治男子婦人積蟲氣塊五勞七傷赤白
痢疾便血注下皮黃水腫十般氣十一般惡蟲
又進飲食除病悅顏色不與他藥相反四季可
服細末三四錢量大小加減服時不喫晚飯三
更用清茶下次蚤桶子內蟲積及粒米盡方可
洗面溫粥補之傷寒孕婦不可服

蛇蟲 第八十五問

巢氏云蛇蟲者九蟲之內一蟲也。長一尺。亦有長五六寸者。或因臟腑虛弱而動。或因食甘肥而動。其動則腹中痛。發作。脰聚行來上下。痛有休止。亦攻心痛。口喜吐涎。及清水。貫傷心者則死。診其脈。腹中痛其脈法當沉弱而弦。反脈大則是蛇蟲也。此痛因食物太早。愛甜怕苦。痛時便高聲啼叫。只看人中上鼻頭唇口一時黑色。卽是此症。當服史君子丸。檳榔散。化蟲丸。藥取下便無事。仲景云。蛇厥者。其人當吐蛇。今

病煩此爲臟寒。烏梅丸主之。其蛇蟲穿心者用薤白根煎湯治之卽安。

史君子丸

治小兒五疳。脾胃不和。心腹膨脹。時復疳痛。不進飲食。漸至羸瘦。並宜服之。

白芍藥 厚朴 製 陳皮 去白 川芎

甘艸 各二錢半 史君子肉 湯浸去黑皮一兩

右爲末。煉蜜丸如芡實大。每服一九。陳米飲仁下。大治小兒腹痛。

檳榔散

治腎痺宜露候良方去蟲後服此。

木香

檳榔

人參

黃連

甘艸

炙各等分

右爲末每一錢小者五分熟水調服。

化蟲丸

治小兒蟲咬心痛來去不定不思乳食。

鴉虱

炒

檳榔

胡粉

練根皮

各半兩

白礬

二錢半
燉火酒

右爲末麩糊丸棗豆大三歲三十九溫漿水入油三五滴吞下食前有蟲皆化爲水大蟲自下且初服甚妙

烏梅丸

治虵厥其人當吐虵今病者靜而復煩此爲寒虵蟲上入其膈故須臾復止得食而嘔又自者虵聞食自出其當自吐虵又治久痢

烏梅

七十

乾薑

二兩

黃連

四兩

蜀椒

五斤

當歸

各

細辛

人參

附子

炮去

桂枝

去皮

黃蘗

各一兩半

右爲末。用酒浸烏梅肉一宿。去核。蒸飯杵成泥。和藥勻。丸麻子大。每服十九。食後米飲下。日三服。忌生冷等物。

陰腫疝氣

第八十六問

巢氏云。足少陰爲腎之經。其氣下通於陰。小兒有少陰之經虛而受風邪者。邪氣衝於陰。與血氣相搏結。則陰腫也。然兒有大小壯弱。起止中節可也。苟腎經氣虛。或坐石不起。冷氣凝之。或近地經久。風邪濕氣傷之。不爲陰腫者。幾希矣。問有啼叫怒氣。閉擊於下。結聚不散。加以水竇不得。亦能發爲此疾。治法。桃仁丸。如小兒外腎腫大。莖物通明。牡蠣粉研極細。雞子清調傅爲佳。又有疝氣名偏墜。急宜下藥。小兒生下

亦有如此者。不疼。不痛。此皆不須攻擊。不治而自愈。若腫痛甚急。當服藥。宜五苓散。青木香丸。湯氏化生丸。并疎氣藥。濟生方牡丹皮。防風爲末。酒調服。極效。五苓散加防風牡丹皮亦效。此症有熱甚者。三黃丸治之。

桃仁丸

治腎經氣虛。或坐石不起。冷氣凝之。或近地經久。風邪濕氣傷之。而成陰腫。間有啼叫。怒氣閉。擊於下結聚不散。加以木實不行。亦能發此疾。

桃仁

去皮尖微炒

辣桂

黑牽牛

白蒺藜

炒香去刺

牡丹皮 大黃

各一錢

右爲末煉蜜丸。麻子大。每服五丸。或七丸。青皮木通蔥白入鹽少許煎湯灌下。或煎大流氣飲研青木香灌下亦可。

五苓散

治水道不分以成癰氣

澤瀉

二兩半

猪苓

白朮

茯苓

一兩半

桂

一兩

右爲細末每服二錢熱湯調下不拘時服多飲

熱湯有汗山卽愈。又治濕熱在裏身發黃疸。濃煎茵陳湯下。食前服。疸病發渴及中暑引飲亦可用。水調服。小兒加白朮末少許。如發虛加綿黃耆人參末少許服之。前十六問辰砂五苓散參用。

青木香丸

治寬中快膈。腹脇痛。心下堅痞。腸中水聲及陰腫等症。

黑牽牛

炒
兩半

朱香

補骨脂

炒

葷澄茄

檳榔

各四錢

右先將粟米飯包檳榔。仍用濕紙包裹煨焦去飯用檳榔同煎藥爲末滴水丸。菜豆大。每服二十丸白湯送下。

松氏化生丸

治疝氣心腹痛上引腰脊。飲食不節而色痿黃。身不能直。百藥俱試。經涉年歲。已在膏肓。宜服此藥。灸脊俞三壯痊。

木香

兩三棱

煨

莪朮

溫紙裹煨

檳榔

青皮

巴豆炒
去巴豆

陳皮

炒

川練子

去核

元花

各半兩
米醋浸炒

右爲細末麪糊丸如黍米大熟水下日進三服

牡丹皮散

治小兒癩腫偏墜

防風

去蘆

牡丹皮

去骨
等分

右爲末每服二錢溫酒調服如不飲酒鹽湯點服亦可加入五苓散木通湯下尤妙

三黃丸

三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項腫

痛。口舌生瘡。中焦有熱。心膈煩燥。不美飲食。上焦有熱。小便赤澀。大便秘結。五臟俱熱。卽生背瘡。癰毒。及治五般痔疾。糞門腫痛。或下鮮血。治疝氣效。

黃連

去蘆

黃芩

去蘆

大黃

煨各十兩

右爲末。煉蜜丸。桐子大。每三十九滾湯下。如臟腑壅實。加服丸數。小兒積熱可服。

盜汗骨蒸 第八十七則

云盜汗出者乃睡而自汗也肌肉虛也圍參湯
治小兒盜汗虛汗或心血液盛亦發爲汗此藥收斂
心氣湯氏云汗者血也血虛亦能自汗作熱宜服圍
參湯牡蠣散龍膽湯治小兒一切盜汗又有通神丸
治通身多汗小兒精氣未盛體性多熱若衣裘傷厚
遇食熱物或犯時氣大病之後重亡津液陽氣偏盛
汗不勝火腑臟積熱薰灼肌體甚則銷燬骨髓是爲
骨熱之病久而不已變成骨蒸日晚發熱肌瘦頰赤

口乾。日夜潮熱。夜有盜汗。五心煩熱。四肢困倦。飲食減少。瘥後餘毒不解。生犀散主之。

團參湯

治小兒虛汗盜汗。或心血液盛。赤發爲汗。此藥收斂心氣。

新羅人參

川當歸

各五錢

右剉散。用雄豬心一箇。切三片。每服三錢。豬心一片。水一盞。煎六分。食前兩次服。

撲汗方

治虛汗

黃連

牡蠣粉

貝母

各半兩

米粉

右末傅於身上。

牡蠣散

治血虛自汗或病後暴虛津液不固自汗

牡蠣

煅二兩

黃芪

生乾地黃

各一兩

右剉散每服二錢水半盞煎五分去滓不拘時

服或爲末米湯下或加小麥煎

龍膽湯

治小兒血虛自汗

龍膽草

釣藤

柴胡

黃芩

桔梗

芍藥

茯苓

甘艸各六錢

蟪蛄

二枚上翅且炙

大黃

煨兩

右十味。咬咀。以水一升。取五合為劑也。服之如

後節度藥者。有虛實藥宜足數。合水也。兒生一日至七日。分一合為三服。兒生八日至十五日。分一合半為二服。以漸加服。皆得下即止。勿再服也。直指方為末。每服一錢。北棗煎服。或加防風麥門冬以導心熱。黃芩減半。去蟪蛄亦可。

治小兒白日精神歡悅至夜臥通身多汗。

龍膽草

不拘多少

右爲末。米醋煮糊丸如椒目大每服五七丸。用飯飲下。一方加防風等分。水煮糊丸。

生犀散

治小兒骨蒸潮熱。盜汗肌瘦。

犀角屑

鼈甲

酥炙

柴胡

知母

地骨皮

胡黃連

各一兩

大黃

桃枝

各半錢

右剉散。每服二錢。水一盞。煎五分。去滓服。無時。

自汗 第八十八問

議曰凡初生至周晬之兒不可自汗自汗則亡陽氣
怯脉虛神散驚風有作凡乳幼自汗切勿止之宜用
白朮二錢半小麥一撮煮令乾去麥爲末煎黃耆湯
調與服以愈爲度有傷寒熱症自汗當以小柴胡加
龍膽治之夏月自汗多宜白虎湯主之熱多自汗而
喘者葛根黃連黃芩湯主之

小柴胡湯

治小兒傷寒潮熱少陽汗出

人參

去蘆

甘草

炙各三錢

黃芩

二錢

柴胡

去蘆八錢

半夏

湯泡七次
乾二錢半

右剉散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎

去滓溫服不拘時

白虎湯

治夏月自汗及陽明風邪不解

知母

三兩

甘草

一兩

石膏

八兩
另研

粳米

三合

右剉散每服三錢水一盞煎六分米熟為度去

滓溫服聖惠方加乾葛

葛根黃連黃芩湯

治太陽病桂枝症下利遂不止脈促者

未解也。喘而汗出者。

葛根 二兩 黃芩

黃連 各七錢 五分

甘草 五錢

有即

右剉散。每服三錢水一盞。煩七分。去滓加減服。
喘甚加葶藶子。

渴症 第八十九問

議曰小兒渴症一見唇紅如丹三五分卽發三五分
渴若紅甚卽渴甚唇紅焦黑者卽久渴虛盛疾加轉
極症危篤故也凡小兒三焦虛煩作渴引飲不歇宜
服三黃丸小兒傷寒後發渴唇口焦乾煩燥盛者白
虎湯主之竹葉湯亦可服小兒瀉利作渴者五苓散
去桂加乾葛尤妙香薷飲車前子散皆可服小柴胡
湯加天花粉亦佳加乾葛尤穩大熱煩躁而渴者黃
連解毒湯亦可服七物黃連湯亦可服極穩大抵小

兒本自盛實易爲生熱熱氣薰蒸故渴而引飲也

三黃丸

治小兒三焦虛煩大渴引飲

黃連

去蘆

黃芩

大黃

煨各十兩

右爲末煉蜜丸桐子大每三十丸熟水下如臍

臍壅實加服丸數小兒積熱可服

竹葉湯

治傷寒發渴

石膏

二兩

半夏

四錢

人參

甘草

炙各二錢

麥門冬

六錢去心

右剉散每服二錢水一盞青竹葉生薑各四片

粳米七十粒同煎嘔加生薑竹葉

白虎湯

治陽明經口渴欲死

知母

三兩

甘草

一兩

石膏

八兩

另研粳米

三分

右剉散每服三錢水一盞煎六分米熟爲度去

滓溫服聖惠方加乾葛

五苓散

澤瀉

二兩半

猪苓

白朮

茯苓

各半

桂

一兩

右爲末每二錢熱湯調下不拘時服多飲熱湯

有汗出即愈。又治濕熱在裏身發黃疸。濃煎茵陳湯下。食前服。疸病發渴及中暑引飲亦可用。水調服。小兒加白朮末少許。如發虛加綿黃耆。人參末少許服之。前十六問辰砂五苓散參用香薷飲。

治夏月中暑下咽即甦

香薷

一兩

白扁豆

炒

厚朴

薑製各半兩

右剉散每三錢水一盞生薑三片煎服。一方加黃連治瀉痢一方加芩芷香蘇散治霍亂吐瀉。暑月感冒傷暑之症。

車前子散

治暑月伏熱霍亂吐瀉

白茯苓

猪苓

香薷

車前子

各等分

人參

減半

右爲末每一錢用燈心湯調下吐疼加芍藥瀉
不止加石蓮肉

小柴胡湯

治小兒少陽寒邪不解口渴

人參

去蘆

甘艸

炙各三錢

黃芩

二錢

柴胡

去蘆八錢

半夏

湯泡七次乾二錢五分

右剉散每服二錢水一盞生薑三片棗二枚煎

去滓溫服不拘時

黃連解毒湯

治大熱煩燥而渴

黃連

三錢

黃蘗

五錢

梔子

四個

黃芩

一兩

右剉散每服三錢水一盞煎六分去滓溫服

七物黃連湯

治症同前

黃連

茯苓

芍藥

各七錢半

黃芩

甘草

乾薑

各一兩

小麥

三合

右剉散白水煎止渴加枳實半兩

煩燥 第九十問

論云。噉煎不安。是煩。噉睡不定。是燥。噉煎者。心經有熱。精神恍惚。內煩不安。心煩則滿。自然生驚。噉睡者。心經有風邪。精神恍惚。心燥生風。熱多不安。煩久而驚風多不定。燥久而搐。治法。涼心經。退熱通利小便。爲佳。熱甚者。黃連解毒湯。輕者。導赤散。玉露散。風熱者。至寶丹。琥珀散。解毒丸。皆可服。有傷寒症者。小柴胡湯。白虎湯。大柴胡湯。去大黃。加乾葛。治之。有驚熱者。金箔鎮心丸。七物黃連湯。尤妙。

黃連解毒湯

治煩悶欲死下咽即生

黃連

三錢

黃蘗

半兩

梔子

四個

黃芩

二兩

右剉散每服三錢水一盞煎六分去滓溫服

玉露散

治噤喉煩躁不安

寒水石

石膏

各二兩水飛

甘艸

三錢

右爲末每服半錢麥門冬湯下湯使隨意加辰

砂金箔名桃紅散亦治急驚入梔子仁名金蓮

散加滑石半兩名玉真散湯氏方治小兒秋夏

伏暑多有熱吐黃涎頭額溫五心熱小便赤少

或乾嘔無物宜服香薷 又宜服玉露散以生薑

汁和白湯調下獨用薑汁一服而止。

導赤散 治心驚內虛邪熱

生地黃 甘艸 木通 各等分

右咬咀。竹葉煎加黃芩赤芍藥兔活燈心煎服。

至寶丹 治精神恍惚心燥生風

生犀屑 玳瑁屑 琥珀 研 朱砂 研

雄黃 細研水飛 各一兩 金箔 五十片 一牛為衣

銀箔 五十片 腦 一分 麝香 一錢 牛黃 半兩

安息香

一兩半爲末以無灰酒飛盡去沙石約取一兩慢火熬膏

右生犀屑玳瑁搗羅爲細末研入諸藥令勻將

安息香膏以重湯煮凝成和搜爲劑如乾卽入

少熟蜜盛不津器中旋丸桐子大二歲兒服二

九人參湯化下大小以意加減又治大人卒中

不語中惡氣中諸物毒中熱暗風產後血暈死

胎不下竝用童便少許生薑自然汁三五滴同

溫過化下五九立效

琥珀散

治煩躁不安消風豁痰

辰砂

一錢半

琥珀

牛黃

僵蠶

炒去絲

南星

水浸夏三日春秋五日冬七日牛膽中梨九佳

全蝎

去毒

白附子

代赭石

天麻

乳香

蟬蛻

各一錢

麝香

五分

片腦

一字

右爲末三歲半字薄荷湯下慢驚加附子

青解毒丸

治小兒五臟積熱毒氣上攻胸臆煩悶咽喉腫痛赤眼癰腫頭面發熱唇口乾燥兩頰生瘡精神恍惚心忪悶亂坐臥不寧及傷暑毒面赤身

熱心煩燥而渴飲食不下

寒水石 石膏 研各 青黛 四兩

右研如粉入青黛和勻蒸餅七箇水調丸芡實
大每服一丸食後新汲水化下或細嚼生薑湯
下亦可中諸毒並宜服及小兒驚風潮熱痰涎
壅塞心胸煩燥煩赤多渴坐臥不穩每三歲是
可服半粒量大小加減

小柴胡湯 治少陽傷寒煩燥不眠

人參 去虛 甘草 炙 黃芩 二錢 柴胡 去蘆

半夏

湯泡七次。乾二錢半。

右剉散。每二錢水一盞。生薑三片。棗一枚。去滓。

溫服不拘時。

白虎湯

治陽明煩躁。

知母

三兩

甘艸

一兩

石膏

八兩

粳米

三合

右剉散。每三錢水一盞。煎六分。米熟為度。去滓。

溫服。聖惠方加乾葛。

大柴胡湯

治腹中結。煩躁下之即愈。

柴胡

去蘆。八錢。

黃芩

赤芍藥

各三錢。

半夏

湯泡七次切片焙乾二錢五分

枳實

去穢麴炒五分

右咬咀薑棗煎加減服之欲下加大黃五錢

金箔鎮心丸

治驚悸痰聚上脘煩躁欠安

朱砂 一兩

白茯苓

人參

甘艸

各半兩

山藥

一兩半

腦子 一錢

牙硝

一錢半

麝

五分

紫河車

二錢半黑豆煮

金箔

十二帖為衣

右為末煉蜜丸每兩半作五十九丸以金箔為衣

每服一九薄苛湯下含化亦可臥時常服安心

鎮神祛邪熱涼咽膈止驚喘

七物黃連湯

治夏月傷寒四肢煩疼發熱其人喜煩嘔逆或滿劇如禍祟寒熱相搏故令喜煩

黃連

茯苓

芍藥

各七錢半

黃芩

甘草

乾薑

各二兩

小麥

三合

右剉散白水煎欲止瀉加枳實半兩